

## Allergies alimentaires du type III

### FACTEURS D'AFFAIBLISSEMENT DE L'ORGANISME COMMENT LES DIAGNOSTIQUER ET LES COMBATTRE ?

#### 1) Introduction :

Le mot intolérance alimentaire est souvent utilisé pour décrire une réaction non désirée du corps après une ingestion d'un aliment. Derrière ce phénomène d'intolérance peuvent se cacher plusieurs mécanismes: l'intolérance proprement dit, qui est une incapacité de digérer certains composants d'un aliment, la mieux connu est l'intolérance au lactose. Beaucoup plus fréquent, mais malheureusement souvent inaperçu est l'allergie du **type III**, car les réactions sont souvent retardés et déclenche **des phénomènes inflammatoires** divers à caractère diffus rendant difficile le lien entre la cause et l'effet. Elle active **les anticorps de type IgG** du système immunitaire.

Le corps réagit par rapport aux allergies alimentaires du type III en fabriquant des anticorps comme il le fait pour se défendre vis à vis d'autres agressions (maladies bactérienne et virales). Ainsi, la façon la plus directe de supprimer allergies alimentaires du type III consiste à éliminer les aliments responsables de la production d'anticorps spécifiques par l'organisme. Cependant, le diagnostic d'une hypersensibilité alimentaire avec des méthodes classiques est difficile.

Comme une multitude d'aliments peut être impliquée dans une allergie alimentaire du type III il est important de doser les anticorps IgG spécifiques vis-à-vis d'un grand nombre d'extraits d'aliments différents dans le but d'établir un profil immunitaire personnalisé et individuel.

Le test immunologique ImuPro300 permet de doser individuellement le taux d'IgG spécifiques dirigées contre **266 aliments** et additifs différents.

L'élimination des aliments non tolérés pendant une période limitée couplée **au principe de rotation** permet d'obtenir des effets thérapeutiques dans un bon nombre de pathologies chroniques :

Localisation	Symptomatologie
Respiratoire	Rhinite, sinusite, asthme, otite
Gastro-intestinal	Vomissements, ballonnements, crampes, nausées, constipation, diarrhée, coliques, colon irritable Maladie de Crohn, recto-colite ulcéro-hémorragique
Peau et phanères	Urticatoire, eczéma, dermatite atopique, acné, psoriasis
Système nerveux central	Migraine, maux de tête, troubles de la concentration, somnolence, dépression, hyperactivité, sclérose en plaques.
Appareil locomoteur	Arthrose, douleurs articulaires, tendinopathies fibromyalgie, pathologies musculaires

	répétitives, spondylarthrite enkylosante, polyarthrite rhumatoïde etc...
Oculaire	Sécheresse des yeux, picotements oculaires
Endocrinien	Diabète de type I Obésité et diabète de type II Thyroïdite
Cardiovasculaire	Hypertension artérielle Athérosclérose

### **Perte de poids induite :**

Connaître ses allergies alimentaires du type III permet de lutter contre diverses maladies de nature inflammatoire mais aussi **de perdre du poids** si besoin **sans effet YoYo** : La méthode Imupro contribue en effet à une meilleure utilisation de l'énergie. La perte de poids est significative car l'organisme fonctionne mieux.

### **2)Le test Imupro : aspects pratiques**

Le test Imupro fonctionne sur le même principe et la même technicité que la plupart de tests biologiques pratiqués quotidiennement dans les laboratoires d'analyse biologique (Test d'hépatite, test de grossesse etc...)

Si le sang analysé contient les **anticorps anti-aliments** spécifiques, le test **ImuPro300** permet de les identifier et de classer l'intolérance aux aliments trouvés selon **un indice d'intensité allant de 1 à 4**.

Dans la pratique, le test est pratiqué à partir d'un prélèvement sanguin de 3ml.

**Dans un délai de 15 jours**, la personne ayant fait le prélèvement sanguin reçoit son profil immunologique, c'est-à-dire la liste de ses intolérances. Il lui est aussi transmis un **dossier personnalisé** avec des conseils détaillés pour la mise en application de la **méthode ImuPro**.

### **3)La mise en route du régime ImuPro :**

Elle consiste à **une exclusion préliminaire** de tous les aliments qui ont donné une réponse positive : Cette période d'exclusion doit durer de **8 à 52 semaines** suivant l'intensité de l'intolérance ceci pour **permettre à l'intestin grêle de s'assainir** en n'étant plus sollicité par les aliments responsables des allergies alimentaires du type III.

Après **cette phase de drainage**, il est **possible de réintroduire les aliments** exclus tout en respectant le **principe de rotation** reposant sur le principe suivant : Les aliments consommés lors d'un repas mettent de trois à quatre jours pour parcourir le tube digestif. L'alimentation alternée impose **de ne manger que tous les cinq jours les mêmes aliments**

pour éviter le développement de nouvelles allergies et accélérer la régression de celles qui sont présentes.

#### **4)Conclusion :**

Le test ImuPro300 représente une réelle innovation dans le diagnostic précis et personnalisé des allergies alimentaires du type III. Il repose sur une technologie reconnue et fiable.

Notre expérience et le suivi des personnes ayant effectué la méthode ImuPro nous permet de préciser que la phase de sevrage ne doit pas créer d'appréhension : la désaccoutumance par rapport aux aliments non tolérés se fait rapidement et les signes d'**amélioration de la symptomatologie apparaissent généralement entre 3 et 15 jours.**

### **Marche à suivre**

Nous contacter :

**R-Biopharm France**

**Secteur Santé ImuPro**

17, Avenue Charles de Gaulle - 69370 St Didier au Mont d 'Or

Tél: 04 78 48 01 95

Email : [contact@intolsante.com](mailto:contact@intolsante.com)

Il vous sera remis ou envoyé un « **kit de prélèvement** » avec toutes les instructions pour la marche à suivre.

Prenez rendez-vous avec un laboratoire d'analyses qui effectuera le prélèvement sanguin, Dans un délai de 15 jours, nous vous ferons parvenir le résultat du test avec les conseils pour la mise en route de la méthode ImuPro.

*ImuPro300 est facturé 490 Euros. Frais port par transporteur compris.*

**site Web : [www.intolsante.com](http://www.intolsante.com)**